

Avertissements agricoles

Publication périodique

EDITION "GRANDES CULTURES"

ISSN 0757 4029

BULLETIN TECHNIQUE N° 23

21 AOUT 1987

MAIS DOUX - FAGEOLETS : Début du 2^e vol de Pyrale dans les zones précoces et normales.

MAIS GRAIN : SURVEILLER les Pucerons noirs.
COLZA : Informations sur le désherbage.

- MAIS DOUX, FLAGEOLETS -

PYRALE :

● Le 2^e vol est détecté en zones précoces et normales : Pontlevoy, Oucques, Talcy (41).

→ Cultures à plus de 10-15 jours de la récolte : **TRAITER** dès réception du bulletin et jusqu'au 31 Août avec DECIS à 0,5 l/ha, FASTAC à 0,4 l/ha ou KARATE à 0,25 l/ha.

→ Cultures à moins de 10-15 jours de la récolte : **PAS DE TRAITEMENT.**

- MAIS GRAIN -

PUCERONS :

● **Surveiller** vos parcelles de maïs grain. Il a été observé de fortes populations de Rhopalosiphum padi dans la région de Châteaudun (28). Les fortes pullulations peuvent faire encore l'objet d'un traitement : 1 panicule sur 2 colonisée, présence de colonies en évolution sur épis et feuilles supérieures.

→ Utiliser PIRIMOR à 0,5 kg/ha avec 500 l d'eau/ha. Si le traitement est effectué par hélicoptère, ajouter AGRAL 90 à raison de 0,05 l/ha.

- COLZA -

Pour le Cher et l'Indre, ces informations sont diffusées également dans le cadre du CLUB COLZA SOPRA.

DESHERBAGE :

Rappel : Sur les parcelles destinées au colza, un déchaumage ou une façon culturale profonde est souhaitable dès la récolte du précédent pour faire lever un maximum de mauvaises herbes ou repousses avant semis.

CHOIX DU PROGRAMME HERBICIDE :

Le programme devra être conçu de manière à contrôler de façon satisfaisante les 4 ou 5 mauvaises herbes dominantes de la parcelle.

● Si vous craignez surtout les dicotylédones adventices (ce qui est vrai dans la grande majorité des cas) :

→ Choisir un produit ou programme bien adapté à la flore de la parcelle (voir tableaux en pages 3 et 4). Préférer un traitement en pré-semis incorporé au sol (TREFLAN, DEVRINOL), ou un traitement en post-semis-prélevée (COMODOR, BUTISAN S), ou un programme associant produit de pré-semis ou prélevée puis BUTISAN S à 1,5 l/ha

Abonnement annuel : 135 F

Chèque à l'ordre du Régisseur de Recettes

à envoyer à l'adresse ci-dessous.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, Rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX - Tel. (38) 86.36.24

EDITION DE LA STATION "CENTRE"

(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret)

Imprimerie de la Station "Centre"

Le Directeur-Gérant : A. SIMONIN

CPPAR N° 530 AD



P47

au stade "cotylédons étalés-première feuille pointante" à des applications strictes de post-levée (cas particuliers : PRADONE TS ou CLERDONE applicables à partir du stade "4 feuilles vraies du colza").

Les traitements de pré-semis ou de prélevée permettent un éventuel rattrapage au coup par coup en post-levée en cas de mauvaise efficacité (par exemple avec LONTREL SF 100). Par contre, une impasse à ce niveau peut conduire à des enherbements difficiles à maîtriser par la suite.

● Si vous craignez aussi les repousses de céréales et la folle-avoine :

➔ Prévoyez un traitement antigraminées complémentaire qui sera effectué à vue en post-levée.

RESULTATS DE L'EXPERIMENTATION "PROGRAMMES DE DESHERBAGE" MENEES PAR LE SPV EN 1986-87 :

● TREFLAN (2 l/ha) en pré-semis puis BUTISAN S (1,5 l/ha) en post-semis-prélevée :

- Dicotylédones : Très bon sur capselle, bon sur véroniques, coquelicot, mouron des oiseaux, lamier, gaillet, moyen sur pensée.

- Graminées : Bon sur vulpin, pâturin annuel. Insuffisant sur repousses de céréales.

➔ Bon programme pour flore à dominante dicotylédones.

● DEVRINOL (2,2 l/ha) en pré-semis puis BUTISAN S (1,5 l/ha) post-semis-prélevée :

- Dicotylédones : Très bon sur capselle. Bon sur géranium, coquelicot, mouron des oiseaux, lamier, gaillet. Moyen sur pensée et véroniques.

- Graminées : Bon sur vulpin, pâturin annuel. Insuffisant sur repousses de céréales.

➔ Bon programme pour flore à dominante dicotylédones.

● COMODOR (3 l/ha) en pré-semis puis BUTISAN S (1,5 l/ha) en post-semis-prélevée :

- Dicotylédones : Très bon sur capselle. Bon sur coquelicot, mouron des oiseaux, lamiers. Moyen sur pensée, véroniques.

- Graminées : Bon sur vulpin, pâturin annuel et repousses de céréales.

➔ Bon programme pour flore à dominante graminées.

● BUTISAN S (1,5 l/ha) en post-semis puis BUTISAN S (1,5 l/ha) au stade cotylédons étalés-première feuille pointante :

- Dicotylédones : Très bon sur capselle. Bon sur coquelicot, mouron des oiseaux, lamier. Moyen sur véronique et pensée.

- Graminées : Bon sur pâturin annuel. Moyen sur vulpin. Insuffisant sur repousses de céréales.

➔ Bon programme pour flore à dominante dicotylédones, supérieur à l'application unique BUTISAN S à 3 l/ha. Programme à privilégier en cas de forte infestation de capselle.

Remarques :

Contre la capselle, confirmation de programmes efficaces et sélectifs :

| PRE-SEMIS (incorporation) | | POST-SEMIS (jusqu'à 3 jours après) | | POST-LEVEE "COTYLEDONS ETALES 1 ^è FEUILLE POINTANTE DU COLZA" |
|---|------|---------------------------------------|------|--|
| TREFLAN à 2 l | puis | BUTISAN à 1,5 l | | |
| DEVRINOL à 2-2,2 l (selon type de sol) | puis | BUTISAN à 1,5 l | | |
| | | BUTISAN à 1,5 l | puis | BUTISAN à 1,5 l |

- La réduction ou le fractionnement de BUTISAN S améliore la sélectivité.

- Si l'on craint une forte infestation de capselle, préférer la double application fractionnée de BUTISAN S.

- En présence de géraniums, supériorité du programme DEVRINOL - BUTISAN S.

HERBICIDES UTILISABLES A L'EPOQUE DU SEMIS ET DE LA LEVEE DU COLZA

| | MATIERE ACTIVE | SPECIALITE COMMERCIALE | DOSE/HA DE SPECIALITE | OBSERVATIONS |
|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|--|
| PRE - SEMIS | diallate | AVADEx | 3,5 à 4 l | <ul style="list-style-type: none"> - Incorporation immédiate après application. - Actif uniquement sur graminées. - Dose de 4 l si folle-avoine et repousses céréales. |
| | trifluraline | NOMBREUSES SPECIALITES dont TREFLAN | 2,5 l | <ul style="list-style-type: none"> - Incorporation immédiate après épandage. - Actif sur graminées, sauf repousses de céréales. - Actif sur dicotylédones : Gaillet et Coquelicot, faible sur Matricaire. |
| | napropamide | DEVRIOL FL | 2,2 à 2,8 l | <ul style="list-style-type: none"> - Incorporation superficielle dans les 2 jours (sauf si pluies importantes). - Actif sur graminées : sauf folle-avoine et repousses céréales. - Actif sur dicotylédones : dont Gaillets, Matricaires. - La dose de 2,8 l est une dose maximum à n'utiliser qu'en sol argileux (+ 25 % argile) (risque phytotoxicité sur la culture suivante). |
| | nitralin + napropamide | ZULAN FULTON | 2,5 kg | <ul style="list-style-type: none"> - Incorporation superficielle dans les 2 jours. - Actif sur graminées (proche de napropamide). - Actif sur dicotylédones dont Matricaires. |
| PRE - SEMIS OU PRE - LEVEE | tébutam | COMODOR | 4 à 5 l | <ul style="list-style-type: none"> - En pré-semis, incorporation uniquement si sol pierreux. - Actif sur graminées : 5 l en pré-semis si risque repousses céréales. - Actif sur dicotylédones. |
| PRE-LEVEE | dimétachlore | TERIDOX | 2 à 3 l | <ul style="list-style-type: none"> - Risque de phytotoxicité (surtout en terres légères) utiliser 2 l. - Actif sur graminées : sauf folle-avoine, repousses céréales. - Actif sur dicotylédones dont Matricaires, Capselles. |
| | métazachlore | BUTISAN S | 2,5 l | <ul style="list-style-type: none"> - A n'utiliser qu'en conditions de semis favorables (préparation de sol, date et profondeur de semis). Même dans ces conditions la sélectivité peut être insuffisante. - Utilisation préférable immédiatement après le semis : possible jusqu'à 3 jours après. - Très bonne efficacité herbicide. - Actif sur graminées sauf repousses céréales et folle-avoine. - Actif sur nombreuses dicotylédones dont Matricaires, Capselles. |
| POST-LEVEE PRECOCE | métazachlore | BUTISAN S | 3 l | <ul style="list-style-type: none"> - A utiliser dès le stade "Cotylédons étalés - 1^{ère} feuille pointante du colza". - La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles. - A la dose de 2,5 l avant la levée des adventices: Bon sur Capselle, Coquelicot, Mouron. Moyen sur Véronique et Pensée. |

HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DU COLZA

| | MATIERE ACTIVE | SPECIALITE COMMERCIALE | DOSE/HA DE SPECIALITE | OBSERVATIONS |
|------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| POST-LEVÉE | carbétamide | LEGURAME PM | 3 kg 5 à 6 kg | - Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de la végétation. - Application possible sur sol gelé. - Bonne action sur graminées ; insuffisante sur dicotylédones contre chiendent de Novembre à fin Janvier. |
| | propyzamide | KERB 50 W | 1,5 kg 2 kg 3 kg | - A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. - Application sur sol gelé. - Bonne action sur graminées ; insuffisante sur dicotylédones contre avoine à chapelet contre chiendent. |
| | propyzamide + diuron | KERB ULTRA | 1,2 kg | - A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6è feuille naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver. - Bonne action sur graminées ; <u>action limitante sur Sanves, Ravenelles.</u> |
| | carbétamide + diméfurone | PRADONE TS | 3,5 à 4 kg | - A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. - Application possible sur sol gelé. - Action sur dicotylédones : efficace sur Véronique, Matricaire, Stellaire, Coquelicot, Lamier ; irrégulier sur Pensée, Gaillet ; Insuffisant sur Sanve. |
| | diméfurone + clopyralid | CLERDONE | 2,5 l | - Sur colza sain bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir du stade 4 feuilles vraies du colza. - Action antidicotylédone : bonne efficacité sur Véronique, Coquelicot, Matricaire, Anthémis, Stellaire, Alchémille, Lamier, Gaillet. Moyen sur Pensée des champs, Capselle. Nul sur Sanve. D'APRES LES RESULTATS DES ESSAIS MENES EN 1986-87, A CONFIRMER. |
| POST-LEVÉE | clopyralid | LONTREL SF 100 | 1 l | - Quelque soit le stade du colza, sur adventices levées. - T° > 10°. Pas de pluie 4 heures après traitement. |
| | alloxydime-sodium | FERVIN + huile | 1 kg + 3l huile 1 à 1,25 kg + 3 l | - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. Action essentiellement sur graminées (sauf Pâturin). 1 l + 1,25 kg + 3 l huile contre graminées vivaces. |
| | séthoxydime | FERVINAL | 2 l + 3l huile 3 l + 3 l | - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. Action essentiellement sur graminées (sauf Pâturin). 3 l + 3 l huile Schering contre graminées vivaces. |
| | fluazifop-p-butyl | FUSILADE X2 + AGRAL | 0,75 l + 0,1 % vol. AGRAL 1,5 l + AGRAL (0,1 %) | - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. Très bonne efficacité sur graminées. 1,5 l + AGRAL (0,1 %) contre graminées vivaces. |
| | haloxyfop-éthoxyéthyl | GALLANT | 1 l 2 l | - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Uniquement à l'automne. Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. Action essentiellement sur graminées. contre graminées vivaces et Pâturin. |
| POST-LEVÉE | quizalofop-éthyl | TARGA + huile | 1,25 l + 2 l 3 l + 8 l | - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. Action essentiellement sur graminées (sauf Pâturin). 3 l + 8 l huile SIFREN contre les graminées vivaces. |